



AVERTISSEMENTS AGRICOLES

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES



BRETAGNE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n°05 du 09 mars 2006 - 2 pages

Grandes Cultures

désherbage pour la qualité de l'eau, maladies et parasites

La mise en oeuvre du suivi phytosanitaire nécessaire pour la réalisation de ces bulletins est effectuée par la DRAF-SRPV et la FEREDec de Bretagne. Elle bénéficie du soutien du Conseil Régional de Bretagne.



Prochain
bulletin : le 23
mars 2006.

COLZA

Stade :

C1-D1 (reprise de végétation à boutons accolés encore cachés).

Ravageurs :

Les vols n'ont pas encore démarré mais la remontée récente des températures constitue un facteur favorable.

Sur les parcelles infestées par les larves d'altises, les galeries dans les pétioles peuvent être très importantes. Cependant, seule une protection automnale pouvait apporter une solution satisfaisante.

Il est inutile d'intervenir dans les prochains jours. Se tenir prêt à détecter les premières arrivées :

- grâce notamment à la mise en place de cuvettes jaunes pour les charançons et les méligèthes,
- et aussi, pour les méligèthes, à l'observation sur les boutons floraux dès qu'ils seront dégagés.

Stade des mauvaises herbes :

Les plantes adventices observées sur les parcelles semées entre les semaines 41 à 44 sont très avancées. Les graminées sont au stade "plusieurs talles" et les dicotylédones ont dépassé le stade rosette et sont très souvent présentes au stade "bien développé".

Les parcelles semées semaine 45 à 47 présentent des différences entre les graminées et les dicotylédones. En effet, les graminées ont très peu évolué depuis le dernier suivi puisqu'elles sont toujours comprises entre les stades "2 à 4 feuilles". Par contre, les dicotylédones ont beaucoup progressé puisqu'elles sont passées des stades "1 à 4 feuilles" aux stades "4 feuilles à rosette, voir très développé". Les mauvaises herbes notées sur ces parcelles sont souvent : la stellaire intermédiaire, la véronique de perse, le fumeterre, la véronique à feuille de lierre, les matricaires, la spargule des champs, le coquelicot...




Photo n°1 : Fumeterre officinale au stade 5 feuilles




Photo n°2 : Véronique à feuille de lierre à 4-6 feuilles

Colza :

Végétation active,
rester attentif.

Céréales :

Désherbage possible des parcelles semées semaine 47.

CEREALES

Stades des céréales :

Blé :

- Semaine 42 : 5 talles, Semaine 43, 44 et 45 : 1 à 5 talles, Semaine 46 : 4 feuilles à 2 talles ; Semaine 47 : 3 feuilles.

Orge :

- Semaine 42 : 5 talles ; Semaine 43 et 44 : 4 à 5 talles, Semaine 46 : 3 talles.

Triticale :

- Semaine 41 : 5 talles ; Semaine 43 : 4 talles.

0260680461200048 30202

© SPV Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation

DRAF Bretagne
Service Régional de la
Protection des Végétaux
280, rue de Fougères
35700 RENNES

Imprimé à la station
D'Avertissements Agricoles
de Rennes
Directeur gérant :
P. MICHON
Publication périodique
C.P.A.P n°528 AD
ISSN n°1167-2382



D3 40 50 44 827

Tableau n°1 : Stade moyen des graminées en fonction des semaines de semis et des zones observées.

	41	42	43	44	45	46	47
22 Est			6	3 F à 6	3 F		
22 Nord Est					2 F		2 F
22 Nord Ouest				2 F	1-4 F		
35 Nord		5	5 à 6				
35 Sud	5 à 6	5 à 6	5 à 6	5 à 6			
56 Est			6				
56 Nord Ouest				6			
56 Sud						4 F	

0,5 : Cotylédons
F : Feuilles

P L : Pas levées
5 : tallage

6 : plusieurs talles

Réglementation :

Précision / retraits

Suite à la décision du comité d'homologation du 7 octobre 2005 et à la décision publiée au J.O. du 22/02/06, les dates récentes de retraits de spécialités commerciales sont ainsi précisées :

Produits phytosanitaires	Limite de vente	Limite d'utilisation
GRAMOXONE plus	28/2/06	30/4/06
GIROR	30/4/06	30/6/06
A base d'endosulfan	21/12/06	30/5/07
A base de naled	31/10/06	30/4/07
A base de triazamate	30/6/06	31/12/06

Tableau n°2 : Stade moyen des dicotylédones en fonction des semaines de semis et des zones observées.

	Semaine de semis						
	41	42	43	44	45	46	47
22 Est			4 F-5	5-6	4 F-5		
22 Nord Est					4 F-5	4 F-5	4 F-6
22 Nord Ouest				5	6		
35 Nord		4 F-6	5-6				
35 Sud	5-6	5-6	5-6	4 F-5			
56 Est			4 F-6		4 F-5		
56 Nord Ouest				5-6			
56 Sud						3 F-5	

0,5 : Cotylédons
F : Feuilles

P L : Pas levées
5 : Rosette

6 : Bien développé

Les parcelles semées semaine 47 peuvent être désherbées car les mauvaises herbes présentes sur ces parcelles sont à des stades assez avancés. Mais n'envisager le traitement herbicide que si les conditions climatiques le permettent.

Dans tous les cas, il est important de suivre l'évolution des stades de la végétation adventice pour intervenir au meilleur moment, tout en tenant compte des conditions météorologiques.

Maladies :

Nous publions, avec le bulletin n°6 joint, la note nationale "résistances aux fongicides" qui donne des éléments importants pour la lutte contre les maladies. Le contexte régional et les conditions climatiques de l'année constituent d'autres éléments importants qui seront repris tout au long des prochains bulletins.

Actuellement, malgré les pluies récentes, l'indice de risque piétin verse reste à un niveau très bas. Quelques rares symptômes de maladies du pied, essentiellement du rhizoctone, ont été observés sur les parcelles.

Sur les feuilles basses, la septoriose est la maladie la plus visible.

Il est beaucoup trop tôt pour envisager une intervention.